

Salmonella bij pluimvee in België: de analyseresultaten van 2025

In 2025 voldeed België aan de vooropgestelde Europese doelstellingen¹ voor *Salmonella* bij alle pluimveecategorieën: fokpluimvee, leghennen, vleeskippen en vleeskalkoenen. De waargenomen prevalenties van de te bestrijden serotypen waren als volgt:

- 0,33% bij fokpluimvee, ruim onder het wettelijk maximum van 1%,
- 1,78% bij legpluimvee, net onder de Europese doelstelling van 2%,
- 0,27% bij vleeskippen, ruim onder het wettelijk maximum van 1%,
- 0,00% bij vleeskalkoenen, waar het wettelijk maximum 1% is.

Bij **vleeskippen** is de prevalentie van *Salmonella* Paratyphi B var. Java in 2025 gedaald (72 tomen) in vergelijking met 2024 (134 tomen). Dit type blijft wel het meest voorkomende serotype gevolgd door *Salmonella* Infantis waarvoor het aantal positieve tomen gestegen is van 39 in 2024 naar 51 in 2025.

Bij **legghennen** was, net als de voorbije jaren, *Salmonella* Enteritidis het meeste voorkomende serotype. In de opfokfase was 1 toom positief voor monofasische *Salmonella* Typhimurium en 1 toom voor *Salmonella* Typhimurium. Bij leghennen in de productiefase waren 15 tomen positief voor *Salmonella* Enteritidis en geen enkele voor *Salmonella* Typhimurium (inclusief de monofasische variant).

Bij **fokpluimvee** waren er 2 tomen op een productiebedrijf positief voor een wettelijk te bestrijden serotype, beiden voor *Salmonella* Infantis. Daarnaast waren er 2 tomen op een opfokbedrijf positief voor een wettelijk bestreden serotype, beiden voor *Salmonella* Virchow.

Hieronder vind je de resultaten van de *Salmonella*-analyses per type pluimvee en een overzicht van de *Salmonella*-serotypes bij Belgische pluimveetomen onderzocht in 2025.



Fokpluimvee

Geen enkele van de 134 geteste tomen (76 beslagen) eendagskuikens fokpluimvee testte positief voor *Salmonella*. Tijdens de **opfokfase** testten 5 van de 328 onderzochte tomen (128 beslagen) positief voor *Salmonella*, waarvan 2 met een te bestrijden serotype namelijk *Salmonella* Virchow. Tijdens de **productiefase** waren eveneens 5 van de 608 onderzochte tomen fokpluimvee (323 beslagen) positief voor *Salmonella*. Twee van deze tomen (0,33 %) waren positief voor een wettelijk bestreden serotype.

Tabel 1: *Salmonella*-resultaten fokpluimvee 2025. De vetgedrukte serotypes zijn wettelijk bestreden serotypes bij fokpluimvee.

Categorie	Beslagen	Tomen	Positief	Serotypes
1 DAG	76	134	0	/
Opfok	128	328	5	S. Agona S. Bardo* S. Montevideo S. Newport* S. Virchow (2x)
Productie	323	608	5	S. Infantis (2x) S. Anatum S. Enterica (2x)* S. Idikan *



Leghennen

Eén van de 262 tomen eendagskuikens (108 beslagen) testte positief voor *Salmonella*: het serotype *Salmonella* Kedougou werd er gedetecteerd. Tijdens de **opfokfase** werden 206 tomen (89 beslagen) onderzocht, waarbij 8 tomen positief testten voor *Salmonella*, waarvan 1 voor *Salmonella* Typhimurium en 1 voor monofasische *Salmonella* Typhimurium. Tijdens de **productiefase** waren 25 van de 844 onderzochte tomen leghennen (571 beslagen) positief voor *Salmonella*. 15 van deze tomen (1,78%) waren positief voor een wettelijk bestreden serotype, meer bepaald voor *Salmonella* Enteritidis.

Tabel 2: *Salmonella*-resultaten legpluimvee 2025. De vetgedrukte serotypes zijn wettelijk bestreden serotypes bij leghennen.

Categorie	Beslagen	Tomen	Positief	Serotypes
1 DAG	108	262	1	S. Kedougou
Opfok	89	206	8	S. Typhimurium S. Typhimurium monofasisch S. Not typable S. Chester S. Enterica S. Montevideo S. Senftenberg (2x)
Productie	571	844	25	S. Enteritidis (15x) S. Agona S. Ajiobo S. Coeln S. Enterica (2x) S. Idikan S. Infantis S. Mbandaka S. Senftenberg S. Westhampton



Vleeskippen

In 2025 testten 7 van de 11.738 tomen eendagskuikens vleeskippen (1.845 beslagen) positief voor *Salmonella*. Van deze positieve tomen was één toom positief voor monofasische *Salmonella* Typhimurium, geen enkele toom was positief voor *Salmonella* Enteritidis.

Tabel 3: *Salmonella*-resultaten vleeskippen 2025. De vetgedrukte serotypes zijn wettelijk bestreden serotypes bij vleeskippen.

Categorie	Beslagen	Tomen	Positief	Serotypes
Ingangscontrolle	1.845	11.738	7	S. Typhimurium monofasisch S. Infantis S. Paratyphi B var Java S. Rissen (2x) S. Mbandaka S. Yoruba
Uitgangscontrolle	1.907	11.966	208	S. Enteritidis (13x) S. Typhimurium monofasisch (11x) S. Typhimurium (8x) S. Paratyphi B var. Java (72x) S. Infantis (51x) S. Derby (9x) S. Minnesota (7x) S. Virchow (3x) Overige (34x)

Van de 11.966 tomen (1.907 beslagen) waren er 208 met een *Salmonella*-positieve uitgangscontrolle. Bij 0,27% van de tomen werd een wettelijk bestreden serotype vastgesteld, namelijk *Salmonella* Enteritidis (13 tomen), monofasische *Salmonella* Typhimurium (11 tomen) of *Salmonella* Typhimurium (8 tomen). Het aantal tomen positief voor *Salmonella* Paratyphi B var. Java is in 2025 gedaald (72 tomen) in vergelijking met 2024 (134 tomen). Dit blijft wel het meest voorkomende serotype gevolgd door *Salmonella* Infantis waarvoor het aantal positieve tomen gestegen is 39 in 2024 naar 51 tomen in 2025.



Tabel 4: Evolutie jaarlijks aantal tomen vleeskippen positief voor *Salmonella* op uitgangscntrole. De vetgedrukte serotypes zijn wettelijk bestreden serotypes bij vleeskippen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
S. Enteritidis	2	9	3	3	4	13
S. Typhimurium	4	14	9	12	15	8
S. Typhimurium monofasisch	6	8	5	4	16	11
S. Paratyphi B var Java	99	112	55	92	134	72
S. Infantis	133	123	92	70	39	51
Overige	187	148	69	63	60	53
Totaal	432	413	233	244	268	208

Vleeskalkoenen

In 2025 testte één van de 168 onderzochte tomen vleeskalkoenen (64 beslagen) positief voor *Salmonella* Bovismorbificans op uitgangscntrole.

Met dank aan Sciensano voor de berekening van de jaarlijkse prevalenties. De laboratoriumanalyses van *Salmonella* bij fokpluimvee werden uitgevoerd door DGZ, ARSIA en FAVV. Bij de overige pluimveecategorieën gebeurden de analyses door DGZ, ARSIA, Lavetan, Poulpharm en FAVV.

¹ Europese doelstellingen voor het terugdringen van *Salmonella* (Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van *Salmonella* en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers):

- **Fokpluimvee** : jaarlijks maximumpercentage van tomen volwassen fokpluimvee positief voor *Salmonella* Enteritidis, *Salmonella* Typhimurium, *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Infantis, *Salmonella* Virchow en *Salmonella* Paratyphi B varians Java mag maximum 1% bedragen.
- **Legkippen**: jaarlijks maximumpercentage van tomen volwassen leghennen positief voor *Salmonella* Enteritidis en *Salmonella* Typhimurium mag maximum 2% bedragen.
- **Vleeskippen**: jaarlijks maximumpercentage van tomen vleeskippen positief voor *Salmonella* Enteritidis en *Salmonella* Typhimurium mag maximum 1% bedragen.
- **Vleeskalkoenen**: jaarlijks maximumpercentage van tomen vleeskalkoenen positief voor *Salmonella* Enteritidis en *Salmonella* Typhimurium mag maximum 1% bedragen