



## IBR-VACCINATIE: **VACCINATIEPROTOCOL** VOOR HET VERWERVEN EN BEHOUDEN VAN HET I2-STATUUT

### Een rund primo-vaccineren (= basisvaccinatie van jonge en aangekochte dieren):

Een primo-vaccinatie is, afhankelijk van het gebruikte vaccin (zie bijsluiter\*), de toediening van 1 dosis of 2 dosissen met een interval van minimum 21 en maximum 35 dagen;

\* Onder voorbehoud, 21/05/2012:

2 dosissen: IBRAXION, BOVILIS IBR MARKER INAC, RISPOVAL IBR-MARKER INACTIVATUM, HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE

1 dosis: BOVILIS IBR MARKER LIVE, RISPOVAL IBR-MARKER VIVUM

- **als basisvaccinatie van EEN KALF DAT WERD GEBOREN OP HET BESLAG:**

Een kalf geboren op het beslag moet primo-gevaccineerd worden tussen 3 en 10 maanden leeftijd. In geval van het gebruik van een '2 dosissen-vaccin' betekent dit dat de 1<sup>ste</sup> geldige dosis vanaf 3 volledige maanden leeftijd kan toegediend worden en dat de 2<sup>de</sup> dosis 21 tot 35 dagen later en in ieder geval uiterlijk op 10 maanden moet toegediend worden.

- **als basisvaccinatie bij AANKOOP:**

- Een kalf dat werd aangekocht vóór de leeftijd van 3 volledige maanden, moet volledig primo-gevaccineerd worden zoals een kalf dat werd geboren op het beslag (zie hoger).
- Een kalf/rund dat werd aangekocht op de leeftijd van 3 volledige maanden of ouder, moet onmiddellijk bij aankomst primo-gevaccineerd worden. In geval van het gebruik van een '2 dosissen-vaccin' betekent dit dat de 1<sup>ste</sup> dosis moet toegediend worden onmiddellijk bij aankomst en de 2<sup>de</sup> dosis 21 tot 35 dagen later.

### Een rund hyper-immuniseren (= halfjaarlijks hervaccineren na primo-vaccinatie):

Een hyper-immunisatie is de toediening van 1 dosis aan een reeds primo-gevaccineerd rund (hervaccinatie), minimum 1 en in ieder geval maximum 8 maanden na de voorgaande toediening.

### Een I2-waardig of hyper-geïmmuniseerd beslag :

Een I2-waardig of hyper-geïmmuniseerd beslag is een beslag waar **OP IEDER MOMENT**;

- **ALLE runderen ouder dan 10 volledige maanden primo-gevaccineerd zijn;**

*Uitzondering: in geval van het gebruik van een '2 dosissen-vaccin' bij een rund dat minder dan 35 dagen geleden werd aangekocht moet minstens de 1<sup>ste</sup> dosis bij aankomst toegediend zijn. In dat geval is de toediening van de 2<sup>de</sup> dosis pas mogelijk vanaf 21 dagen na aankomst en moet in ieder geval uitgevoerd zijn uiterlijk 35 dagen na aankomst.*

- **ALLE runderen ouder dan 16 volledige maanden hyper-geïmmuniseerd zijn.**

*Uitzondering: een aangekocht rund moet uiterlijk 7 maanden na aankomst voor de 1<sup>ste</sup> maal gehervaccineerd zijn. Afhankelijk van de leeftijd bij aankoop kan dit dus de 16 maanden overschrijden.*